



COLECTIVO
LATINOAMERICANO
DE JÓVENES



con el apoyo de

W.K. KELLOGG
FOUNDATION



FLACSO

FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES

Congreso Latinoamericano de Jóvenes Investigadores en Juventud:

Jóvenes en el Saber

(“Estudio de conocimientos, creencias, actitudes y prácticas (CCAP) de los y las jóvenes que viven con el Virus de Inmunodeficiencia (VIH) y su condición de salud en relación con los medicamentos antirretrovirales”)

(José Jairo Valenzuela Luna)

(Mayra Matilde Tarez Rosario

Y

Leda Nieves Herasme Sena)

(República Dominicana)

Noviembre 2008, Santiago de Chile

Objetivo General:

- ❖ Determinar los conocimientos, las actitudes y las prácticas de las Personas que Viven con VIH y SIDA (PVVS), sobre su condición de salud y la relación con los medicamentos antirretrovirales, en jóvenes de 18-30 años, para contribuir al diseño e implementación de una propuesta de intervención que promueva valores y actitudes responsables de autoprotección, auto cuidado, prevención de las Infecciones oportunistas y la propagación del VIH/SIDA.

Objetivos Específicos:

- ❖ Obtener datos que nos permitan profundizar en el conocimiento de las conductas sexuales de las Personas que Viven con VIH y SIDA (PVVS) y la posible exposición a riesgos de reinfección.
- ❖ Conocer el nivel de información que tiene la población sujeta del estudio sobre la condición de VIH+, las normas nacionales de actuación frente al VIH/SIDA, así como su percepción, actitudes y comportamientos en relación al uso de los medicamentos antirretrovirales, y el cambio de vida a partir del diagnóstico.

Los instrumentos utilizados fueron:

- Una lista de informantes claves
- Un cuestionario de encuesta
- Una guía temática para la discusión de los grupos focales
- Una lista de todos los centros de atención integral en el Distrito Nacional.

Distribución de la muestra por centros

Centros	población	n
IDEV	102	17
Dermatología	27	5
Activo 20-30	50	8
Morgan	75	13
ASOLSIDA	20	3
Hogares	20	3
ALAS	6	1
Total	300	50

Metodología

- El presente estudio es un diseño y ejecución de una investigación y Análisis cuantitativo, mediante las técnicas de encuestas y discusión de grupos focales. Los instrumentos de recolección de la información fueron elaborados a partir de los objetivos y descripción del proyecto o propuesta de estudio.

- Es importante hacer notar que con esta muestra no se pueden hacer Inferencias sobre la población total de personas infectadas con VIH en Santo Domingo, ya que no se tomó en cuenta todos los centros de la provincia de Santo Domingo que prestan servicios de salud a la población sujeta del estudio.
- Con la muestra resultante se pueden hacer Generalizaciones sobre la población atendida en los centros muestreados.

Principales Conclusiones (Resultados)

- De acuerdo a los resultados de esta investigación llegamos a las siguientes conclusiones:
- Los resultados del estudio evidencian una mas alta incidencia del VIH y el SIDA en las mujeres que en los hombres (62.0% vs. 38.0%).
- Las edades de mayor prevalecía es entre 25 a 29 años con un 40.0%. Los resultados también nos revelan que la mayoría de las Personas que Viven con VIH y SIDA (PVVS) que acuden a los Centros de Salud muestreados son solteros/as (54.0%) o en unión libre (28.0%).

- Los datos también evidencian que es una población económicamente en desventaja ya que la mayoría está desempleada (54.0% vs. 46.0% que está empleada).
- En cuanto a la historia del diagnóstico, los resultados muestran que más del 70.0 % de las Personas que Viven con VIH y SIDA (PVVS) en el estudio tienen menos de 6 años de habersele diagnosticado VIH + y el 28 % tiene más de seis años.

El nivel de conocimiento en relación al tratamiento Antirretroviral

- Es bajo, ya que solo el 30% respondió conocer el tipo de tratamiento así como el nombre de sus medicamentos, citando el Triple tratamiento como el más usado.
- Aunque a las Personas que Viven con VIH no se le pregunto si conocían la función o desempeño del tratamiento, nos atreveríamos a decir, que tienen la percepción sobre el impacto del mismo en su salud y vida. Esta afirmación la hacemos partiendo del resultado de indagar sobre las actitudes frente al inicio del tratamiento antirretroviral, contando con que el (88%) lo inició en seguida que lo recibieron, así como el 90% que respondió que no dejaría dicho tratamiento.

Más del 50.0% manifestó que la/s pareja/s que ha tenido conocen de su condición VIH +.

- El 84.0% se consideró heterosexual; el 8.0 % homosexual y el otro 8.0% no supo definir su preferencia sexual.
- Más del 80.0% opinó que las parejas seropositivas deben usar preservativos en sus relaciones sexuales y entre las razones de más peso se encuentran: para evitar la reinfección o la transmisión del VIH y para preservar la salud y/o protegerse.

- El Nivel de conocimiento de las personas entrevistadas acerca de las Infecciones de Transmisión Sexual es mayor con respecto al conocimiento que tienen sobre las Infecciones Oportunistas (86.0% vs. 64.0%).
- Según su criterio las Infecciones Oportunistas más comunes tanto en las mujeres como en los hombres son en orden de importancia: la tuberculosis, la candidiasis y la Toxoplasmosis.
- De igual manera, las infecciones de transmisión sexual más comunes son: la gonorrea, la sífilis y el chancro. En Otras destacan: VIH-SIDA y el Papiloma Humano.

- Se verifica una relativa vigilancia del estado de salud del grupo sujeto de la encuesta, pues el (100.0%) se había realizado de Recuento de CD4; el 90.0% (45 de los 50) la de Carga Viral del VIH y sólo el 8.0%(4 de los 50) se habían realizado la Prueba de Resistencia.

En el 2002 se mide por primera vez en República Dominicana (R.D.) la prevalencia de VIH en una muestra a nivel nacional arrojando una prevalencia de 1% de la población entre 15 y 49 años, aproximadamente 46,500 personas afectadas.

- La epidemia del VIH antes se concentrada en grupos de alto riesgo como eran los homosexuales y las trabajadoras sexuales. Hoy en día se a convertido en una epidemia generalizada (a toda población).
 - Los casos de SIDA en R.D. están concentrados entre las edades de 15 a 44 años representando el 79.6% de los casos acumulados por el sistema de vigilancia en el periodo 1999-2003.
 - Los casos de SIDA entre la población de 25-34 años representan un 40% de los casos reportados.
- Los y las jóvenes entre las edades de 15 y 24 años constituyen un 18% de los casos.
- La forma de transmisión más frecuente es por contacto heterosexual

Recomendaciones

- Sustentados en la informaciones y datos obtenidos en la investigación se requiere de una intervención de las autoridades de salud correspondiente al área de VIH y SIDA en la República Dominicana para que se implementen programas para facilitar información y conocimientos a las Personas que Viven con VIH y Sida (PVVS). Existen personas empoderadas y con conocimientos que están dispuestas a ser parte de un proceso capacitación dirigidos a Personas que Viven con VIH y SIDA (PVVS).

- Se requiere para aumentar la calidad de vida de las personas infectadas y el conocimiento a sus familiares sobre temas de salud, impartir charlas, talleres en todas las Unidades de Atención Integral (UAI) a nivel nacional y en los grupos de apoyo, así como seminarios, conferencias y constantes capacitaciones tanto para las personas afectadas por la condición del VIH como para el personal de salud que laboran en los centros médicos que brindan asistencias a los usuarios.

- Existen grupos muchos de apoyo para Personas que con VIH y SIDA (PVVS) que viven en constante inactividad por falta de apoyo económico y de proyectos que le garantice un desarrollo en la Sociedad. Se deben tomar medidas para apoyar más a las personas que viven con VIH y SIDA , que el Estado Dominicano comprenda que las Personas que Viven con VIH (PVVS) son parte de la solución y no del problema, que se adopten medidas para lograr una inserción social de estos grupos marginados.



¡MUCHAS GRACIAS!